



IPREN GEL, 5% IBUPROFEN



Om man har överansträngt sig; tränat på ett nytt sätt eller tagit i lite för mycket i de vardagliga aktiviteterna, kan man lätt få ömma muskler och leder. Då passar Ipren Gel som snabbt ger lindring. Ipren Gel innehåller ibuprofen, precis som de övriga Ipren produkterna, och skall smörjas in på det ömmande eller smärtande området. Eftersom gelen verkar lokalt är den kroppsliga påverkan liten. Ipren Gel rekommenderas från 16 år.

Ipren Gel skall inte användas av den som är överkänslig mot acetylsalicylsyra, ibuprofen eller andra antiinflammatoriska medel, får hudreaktioner efter behandling eller har eksem, akne, infektioner eller öppna sår på behandlingsområdet. Ipren Gel skall heller inte användas under graviditetens tre sista månader. Den skall inte komma i kontakt med slemhinnor eller ögon och har man astma bör man rådfråga läkare innan användning. Använd inte Ipren Gel under tätt åtsittande förband.

DOSERING

Massera in gelen på det smärtande eller inflammerade området tre gånger dagligen. Vanligen räcker det med 9–10 gram gel per dag (5 gram motsvaras av en cirka 10 centimeter lång gelsträng). Undvik direkt solljus eller solarium på det behandlade området under 2–3 veckor efter behandlingen. Behandlingens längd bör inte överstiga en vecka.

Om det är något du vill fråga om Ipren är du välkommen att kontakta oss på Pfizer Consumer Healthcare. Telefon: 08-550 520 00.



Pfizer AB, 191 90 Sollentuna. Tel 08-550 520 00.

Ipren®

Mot all tillfällig värk och feber



För hela familjen

IPREN – FÖR HELA FAMILJEN

Ipren finns receptfritt för hela familjen vid alla typer av tillfällig värk och feber.

HUR HJÄLPER IPREN?

Ipren innehåller ett ämne som heter ibuprofen. Ibuprofen verkar genom att hämma kroppens produktion av prostaglandiner; ämnen som ger upphov till värk, smärta och feber.

EFFEKTIV MOT ALL TILLFÄLLIG VÄRK OCH FEBER

Eftersom prostaglandiner är inblandade vid så gott som alla typer av tillfällig värk, hjälper Ipre vid såväl huvudvärk som tandvärk, muskelvärk, ledvärk och mensvärk för att ta några vanliga exempel. Vid smärtor där inflammation ingår har Ipre en dubbel effekt då också själva inflammationen – som i sig ger upphov till smärta – motverkas.

Ipre är också febernedsättande och minskar ”förkylningsvärk” i muskler och leder.

IPREN – SKONSAMT OCH SÄKERT

Ipre (ibuprofen) är ett säkert värkpreparat. Det är skonsammare mot magen än preparat med acetylsalicylsyra. Förgiftningsrisken vid en eventuell överdosering eller felanvändning är låg.

IPREN TABLETTER, 200 MG OCH 400 MG



Ipre 200 mg rekommenderas från 6 år och till vuxna som bara har lite lättare värk eller feber.

Ipre 400 mg rekommenderas vuxna och ungdom från 12 år och passar de som har litet mer ont. Vid all värk med inflammatoriskt inslag samt mensvärk är Ipre 400 mg lämpligast.

Skall ej användas av personer som har eller har haft magsår, personer överkänsliga mot acetylsalicylsyra, ibuprofen eller vissa andra antiinflammatoriska medel.

IPREN 200 MG

	Dosering	Gånger/dygn
Barn 6–12 år (över 20 kg)	1 tablett (200 mg)	upp till 1–3 ggr/dygn

IPREN 200 MG

	Dosering	Gånger/dygn
Vuxna och barn från 12 år	1–2 tabletter (200–400 mg)	upp till 3–4 ggr/dygn*

*Max 6 tabletter (1200 mg)/dygn

IPREN 400 MG

	Dosering	Gånger/dygn
Vuxna och barn från 12 år	1 tablett	upp till 1–3 ggr/dygn**

**Max 3 tabletter (1200 mg)/dygn

Har inte besvären gått över efter 5 dagar bör du kontakta din läkare.

IPREN FÖR BARN



För de minsta finns Ipre för barn både i flytande form (oral suspension) och som stolpiller (suppositorier). Flytande Ipre är sockerfri, har god apelsin smak och passar de som vill och kan svälja medicinen själva. Ipre suppositorier är enkla att ge till barn som inte vill, eller har svårt att svälja medicin.

Ipre för barn har en god febernedsättande effekt och verkar länge, minst 6 timmar. Ipre för barn kan ges till barn från 6 månader. Från 6 år finns även Ipre 200 mg tabletter.

Samråd alltid med läkare innan du ger Ipre till barn med astma. Skall inte ges till barn med akut magsmärta, magsår eller barn som är överkänsliga mot acetylsalicylsyra.

DOSERING

Utgå från barnets kroppsvikt när dosen beräknas (åldersangivelsen är ungefärlig). Dosen bör ges var sjätte timme och högst fyra gånger per dygn. Använd inte Ipre mer än 3 dagar i följd, utan att först rådfråga läkare.

IPREN ORAL SUSPENSION 20 MG/ML

IBUPROFEN

Vikt, kg	Ålder	Dosering	Gånger/dygn
7–10 kg	6–12 mån	2,5 ml	3
10–14,5 kg	1–2 år	2,5 ml	3–4
14,5–25 kg	3–7 år	5 ml	3–4
25–40 kg	8–12 år	10 ml	3–4

IPREN SUPPOSITORIER(SUPP) 125 MG

IBUPROFEN

Vikt, kg	Ålder	Dosering	Gånger/dygn
8–15 kg	ca 6 mån–3 år	1/2 supp	1–4
15–30 kg	ca 3–9 år	1 supp	1–4
30–50 kg	ca 9–13 år	2 supp	1–4